Los métodos de terapia de ozono en el tratamiento de peso superfluo.
Uphimtseva L.A. (Rusia)

Durante un año, 77 pacientes de sexo femenino con la obesidad (fases I-II), en las edades de 35 a 47 años, se han estudiado. Entre ellos, 56 pacientes de sexo femenino de manifiesto, según USI:

La difusión cada vez mayor las etapas I y II (todas las mujeres viven en Irkutsk Irkutsk o región, que es el territorio de endemia bocio), un 15% en estos pacientes había tratado por el yodo y preparados de hormonas tiroideas.

El nivel de TTH fue baja y se acercó a la cifra más baja de la norma de nivel.
Cifra de colesterol, b-LP y aterogénico coeficiente aumentó a 3.8.

Por lo tanto, la causa del exceso de peso del cuerpo en este grupo experimental se combina: alimentario y la insuficiencia de la función de la tiroides. Para el tratamiento, las infusiones O.P.S. y subcutánea inyections 02/03 en S.Z.C. fueron utilizados durante 10 días. Los procedimientos se alternan en un día.

Después del tratamiento:

U.S.J es sin dinámica negativa.
Hormona cifra alcanzado el nivel normal.

Cifra de colesterol y b-LP tenía una tendencia a la disminución y el índice fue menor aterogenicidad 3.6. Índice de masa corporal disminuyó un 7%, como promedio. Medidas antropométricas (mama caderas, los hombros y la cintura) se redujo un 4% - 7%, como promedio. Se recomendó a la baja dosis de la medicación profiláctica y de la tiroides a estos pacientes.