La terapia de ozono de una enfermedad ulcerosa duodeno. Kulyoshina NV, Kiseloyova SV, Fatichov RR, Peretyagin SP, Kostina OV, Kuleshin VN y Struchkov A.A. (Rusia)

Los modernos sistemas de tratamiento para la enfermedad ulcerosa permite lograr una curación de la úlcera en no más de 70 - 89% de los pacientes en un período de 25 a 45 días y con una frecuencia de recurrencia en el 50 - 60% de los pacientes. Los diferentes medicamentos antibacterianos (en dosis altas) se utilizan para la erradicación del Helicobacter pylori. Diferentes efectos secundarios se han reportado con el uso de estos sistemas de tratamiento, además de la resistencia de Helicobacter pylori a determinados antibióticos. Hemos tratado 44 pacientes con enfermedad ulcerosa duodeno, utilizando la terapia de ozono, en el marco del pro-antioxidantes y de control del sistema mediante un método de chemoluminiscense. El tiempo de evolución de la enfermedad fue de 7 a 11 años. Dolor se observaron en el 76% de los casos, el ardor de estómago en un 33%, constipations en el 31%, trastornos del sueño en el 60% antes de la terapia de ozono. Según datos de la úlcera fibrogastroduodenoscopy, duodenal bulbos eran en su mayoría localizados en la pared anterior en 39% de los pacientes. En el 72% de los pacientes de la enfermedad ulcerosa se asoció con Helicobacter pylori. El esquema de tratamiento incluye beber agua mineral ozonizado, dos veces al día, en ayunas, con un volumen de 400 - 500 ml, cuando expresó un síndrome doloroso existido, y aún más en después de tomar el agua ozonizado, los pacientes que tomaban 25 - 30 ml de aceite de oliva ozonizado. Además, todos los pacientes han sido infundidas por vía intravenosa, 3 veces a la semana durante 3 semanas. El uso de este tratamiento de terapia de ozono permitidos para lograr una úlcera epitelización en 8 - 10 días. Las úlceras eran curación sin la formación de cicatriz gruesa y no han ido acompañadas de una deformación de la expresada bulbo duodenal. La erradicación del Helicobacter pylori se llevó a cabo en el 82% de las observaciones clínicas. No desviaciones de los sistemas antioxidantes del organismo se han observado.