Eficacia de la ozonoterapia en pacientes con hipertónica angioencephalopathy.

Kontorschikova NC, NY y Usmanova Litvinova AI (Rusia)

Elegimos 3 grupos de pacientes con Angioencephalopathy hipertónica (HAEP) en la edad de 24 – 56: primer grupo tiene 10 velotrainings como media por curso de tratamiento (30 – minutos diarios entrenamientos con 60 – 75% de cargas), segundo grupo recibió por vía intravenosa inyección de solución fisiológica ozonizada (5 procedimientos cada dos días) y el tercer grupo con terapia de ozono y velotrainings. Todos los grupos recibieron medicamentos hipotensores. Peroxidación lipídica (LP) y actividad antioxidante (AOA) se realizaron pruebas de control antes y después del tratamiento, que incluía la evaluación chemiluminogramme (Imax / S, Imax / TL, S / TL, 2a/TL TG), análisis de dieno conjugados y trien (CC, TC) y de bases de Shiff (SB). Había obtenido Imax / S descenso (0,26 a 0,14, p = 0,03) y Dinamarca y los conocimientos tradicionales tendencia cada vez mayor en el primer grupo. LP inicial productos – DK y los conocimientos tradicionales, los productos finales LP – SB, Imax / TL, S / TL había una tendencia a la disminución en el segundo grupo. Se observó a S / TL descenso (de 35,74 a 22,31, p = 0,04), los conocimientos tradicionales, la SB, el Imax / TL tendencia decreciente y Imax / S tendencia cada vez mayor en el tercer grupo, con lo que demuestra el aumento de la AOA. Teniendo en cuenta el estilo de vida sedentario de los pacientes y la corta duración de la formación que proponemos cargas físicas para ser un factor de estrés con una disminución de la AOA. Ozono y velotrainings combinación promueve la adaptación de estrés.